

AUS DER GYNÄKOLOGISCHEN POLIKLINIK MÜNCHEN
VORSTAND PROF. DR. O. POLANO



ÜBER EINEN FALL
VON OVARIAL-KARZINOM
MIT CHORIONEPITHELIOMÄHNLICHEN BILDERN
BESONDERS AUCH IN DEN METASTASEN



Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
in der gesamten Medizin

verfaßt und der Hohen medizinischen Fakultät
der Bayerischen Ludwig-Maximilians-Universität
in München

vorgelegt von

ALFRED RALL

aus ULM a. D.

Druck von
RUTHARDT & WORNER
Tübingerstr. 85 Telef. 721 63



Über einen Fall von Ovarial-Karzinom

mit chorionepitheliomähnlichen Bildern, besonders auch in den Metastasen.

In der gynäkologischen Universitätspoliklinik zu München kam folgender Fall von Ovarialkarzinom mit Rezidiv und Metastase in der Pectoralismuskulatur unter der rechten Mamma zur Beobachtung.

Die Patientin, 39 Jahre alt, kommt am 9. September 1926 in die Klinik. Wir erfahren von ihr folgende Anamnese: Die Patientin spürt seit einigen Monaten im linken Unterbauch einen Knoten, der ständig an Größe zunimmt. Dabei ziehende Schmerzen im Kreuz. Kein Blutabgang. Kein Ausfluß. Dagegen trat von April bis Juni eine Gewichtsabnahme von 8 Pfund auf, dann wieder eine Zunahme von 6 Pfund.

An früheren Krankheiten machte sie in der Kindheit Scharlach, Diphtherie, später mit 20 Jahren eine Bauchfellentzündung durch. Die Menfes traten mit 16 Jahren schwach, in der Dauer von 4 Tagen auf; in der Folgezeit regelmäßig. Die letzte Periode war Ende August. Die beiden letzten Perioden waren sehr stark von achttägiger Dauer ohne Schmerzen. Zwei Geburten (1906 und 1908) verliefen normal. Kein Abort. Psychisch ist die Patientin sehr nervös. Der Schlaf schlecht. Der Stuhlgang ist normal. Störungen, Brennen beim Wasserlassen sind nicht vorhanden.

Status: Der Puls ist regelmäßig, die Respiration gleichmäßig, die Temperatur normal.

Konstitutionstyp: Habitus pyrenicus. Bauchdecken rechts gut eindrückbar. Mäßige Adipositas. Gutes Allgemeinbefinden. Normaler Gewebsturgor.

Im linken Unterbauch ist ein großer, derber, knolliger Tumor fühlbar. Er reicht bis zum linken Rippenbogen. Die Schmerzhaftigkeit bei Befatung ist mäßig. Der Tumor beweglich und gut abgrenzbar.

Genitalbefund: Der Uterus ist vom Tumor nicht sicher abgrenzbar. Der Tumor liegt dem Uterus unmittelbar links an und scheint mit ihm verbacken zu sein.

Die Cervix ist derb, mit derben kleinen Knoten.

Das rechte Parametrium ist schwielig infiltriert, schlecht beweglich.

Keine Drüsen in der Leistengegend fühlbar.

Rektaluntersuchung ohne Befund.

Cystoskopiebefund: Große Blasenkapazität. Die linke Seitenwand nach der Gegend des Trigonum zeigt starke Gefäßinjektion. Der Bereich des linken Urethers erscheint vorgewölbt, wodurch sich links oberhalb desselben eine nischenförmige Eindellung der Blase ergibt.

Als Operation wurde die supravaginale Amputation des Uterus und Exstirpation beider Adnexe ausgeführt. (Prof. Polano).

Nach Eröffnung der Bauchhöhle entleert sich eine geringe Menge leicht gelblich gefärbter Ascites-Flüssigkeit. An der linken Bauchseite erscheint ein ca. Mannskopf großer, papillomatös gebauter Tumor, der anscheinend vom linken Ovarium ausgeht. Der Uterus wird mit einer Faßzange gefaßt und heraus gezogen.

Dabei zeigt sich, daß die rechte Tube in eine Hydrosalpinx verwandelt ist. Deshalb wird die Exstirpation beider Adnexe samt Uterus vorgenommen:

Unterbindung und Durchtrennung des rechten Lig. ovaricopelv. und Abtragung der Tuben. Das Peritoneum wird an der Vorderseite des Uterus in der Gegend der Cercixgrenze durchtrennt und nach abwärts geschoben, was mit einigen Schwierigkeiten infolge Verwachsungen zwischen Blase und Uterus verbunden ist. Darauf folgt Abklemmen des rechten Parametriums und Durchtrennung. Der Uterus wird supral-vaginal abgefaßt, und das linke Parametrium mit der A. uterina unterbunden. Nach Abtragung der linken Tube und Durchtrennung des linken Lig. ovaricopelvicum wird das ganze Präparat entfernt. Einige blutende Stellen im Douglas werden durch Umstechung gestillt. Der Cervixstumpf wird vernäht und das Peritoneum des Douglas unter Einbeziehung der Adnexstümpfe vernäht. Die Appendix wird in typischer Weise abgetragen; der Stumpf durch Tabaksbeutelnaht versenkt. Es folgt Schluß der Bauchhöhle, Muskel-Fascien-Fettnaht; in die Haut werden Herff'sche Klammern und einige Zwirnfäden gelegt.

Diagnose: Ovarium-Tubenkarzinom (entartetes Kystadenoma papillare) links; Ovarialmetastase mit Hydrosalpinx rechts. Ascites.

Das Präparat wird als Ganzes nach der Operation in 10% Formalin fixiert; aus den verschiedenen Stücken des Tumors wird Material entnommen, in Parafin eingebettet, in Stufen geschnitten und mit Hämatoxilin-Eosin gefärbt.

Durch Uterus und die Adnexe bzw. die Tumormassen wurde ein Frontalschnitt gelegt, der einen Einblick in das Lumen des Uterus gewährt und das Verhältnis der linken Tube, der rechtsseitigen Ovarialmetastase, der vorhandenen Hydrosalpinx zueinander und zum Tumor des linken Ovariums klargelegt.

Makroskopisch ergibt sich links ein mannskopfgroßer Tumor des linken Ovariums. Die Oberfläche ist teils klein-, teils großhöckerig, teils solid derb, teils zystisch anfühlbar. Die Farbe der Oberfläche ist gelblich, mitunter bläulich-violett durchscheinend. Der Schnitt zeigt mehrkammerige Zysten von Erbse-Kirschkernegröße, in die sich manchmal märkig papilläre Bildungen vorstülpen. Die Zysten sind erfüllt mit bräunlich bröckeligen Massen. Die Tube ist mitergriffen, bleistift dick, noch gut gegen das Ovarium abgrenzbar, gegen das Ostium abdominale bindegewebig verschlossen, ovarialwärts auch von bräunlichen bröckeligen Massen erfüllt.

Die Metastase rechts zeigt das Ovarium von derselben zystisch märkigen Beschaffenheit, vielleicht etwas derber als den Tumor links. Die Tube ist in eine Hydrosalpinx verwandelt.

Histologisch zeigt der Haupttumor links folgendes Bild: Es handelt sich um ein papilläres, zystisches Ovarialkarzinom.

ein entartetes Kystadenoma papillare mit reichlicher Nekrose, die sich besonders gegen das Zentrum des Tumors auswirkt. Man findet breite Zottenbänder, die beiderseits bekleidet sind mit kleineren Zotten in Fiederstellung; bisweilen erweckt es den Anschein von Zystenbildungen, die angefüllt sind mit papillären Wucherungen von Karzinomelementen.

Das zwischen den Karzinommassen liegende Bindegewebe zeigt neben zahlreichen Fibroblasten sehr viele Bindegewebsfasern mit entsprechenden Blut- und Lymphgefäßbündeln. In manchen der mit papillomatösen Massen angefüllten Hohlräume tritt die Papillenbildung mehr in den Hintergrund; es handelt sich dann mehr um wandständige kleinere Zotten. Der Hohlraum ist dann angefüllt mit einer sich lebhaft mit Eosin färbenden, geronnenen Masse, die beim Aufschneiden des Tumors als Zysteninhalt imponierte. Streckenweise macht das Karzinom einen mehr soliden Eindruck. Was die feineren histologischen Einzelheiten anlangt, so handelt es sich sowohl bei der Auskleidung der zystischen Räume, wie bei der Bekleidung der papillären Zotten um histologisch oft sehr differente Zellbeläge. Bisweilen lassen die Zotten einen regelmäßigen Aufbau aus Epithel und dazwischen liegendem Stroma, wie wir es bei einem gewöhnlichen Adenom finden, erkennen. Doch treten auch ganz solide Zellknospen auf, die lediglich aus polymorphen Zellen bestehen. Außerdem haben die Epithelien eine ausgesprochene Neigung kleine Zysten zu bilden, die, grob gesprochen, an Follikel erinnern. Im allgemeinen handelt es sich um sehr vielgestaltige Karzinomzellen. Neben rein zylindrischen oder kubischen Zellen, die sehr oft mehrschichtig liegen, finden wir große polygonale Zellen und ziemlich häufig monströse Zellformen mit großen dunkelgefärbten Kernen. Dann und wann stößt man auf synzytienartige Zellkomplexe, auch auf homogene Massen.

Die linke Tube zeigt sich ebenfalls von Karzinom befallen. Sie ist ausgefüllt mit den eben beschriebenen papillären Karzinommassen, die stellenweise in die Muskulatur eindringen. Auffallend an manchen Stellen ist die an deciduale Reaktion erinnernde Beschaffenheit des submukösen, in diesem Falle subkarzinomatösen Gewebes. Man sieht blasige deciduaähnliche Zellen. Die Tubenwand zeigt streckenweise geringe rundzellige, entzündliche Infiltration mit einigen Plasmazellen. Von der ehemaligen Schleimhaut der linken Tube ist im Bereich des großen Tumors nichts mehr nachzuweisen.

Die Metastase im rechten Ovarium zeigt dieselben histologischen Merkmale, wie der große linke Tumor. Die Tube, die eine Hydrosalpinx darstellt, erwies sich frei von Karzinom.

Um die Verhältnisse im Parametrium zu kontrollieren, wurde der linke Teil des Uterus im Zusammenhang mit dem Parametrium gelassen. Es zeigt sich dabei, daß die Schleimhaut des Uterus-Kavums frei ist von Karzinom und außer einer Neigung zu Zystenbildung nichts besonderes aufweist. Die Schleimhaut befindet sich kurz vor dem Prämenstruum. Auffallend ist allerdings, daß sich viele Schleimhautkomplexe bis tief in die Muskulatur erstrecken. Im angrenzenden Parametrium zeigten sich Tumormassen vom gleichen histologischen Aufbau wie die vorhin beschriebenen, die in die umgebenden Lymphbahnen Ausläufer gegen den Uterus schicken. Das sie umgebende Gewebe zeigt die gleiche Reaktion wie die Submukosa in der Tube.

Die entzündliche Reaktion, die das Karzinom auf die Umgebung auslöst, ist ziemlich gering.

Die Appendix, die bei der Operation mitentfernt wurde, zeigt keine entzündlichen Veränderungen der Schleimhaut, noch anderer Schichten.

Es handelt sich also nach dem histologischen Befund um ein karzinomatoses entartetes Kystadenoma papillare, einer dementsprechend zystisch-drüsigen Bildung mit reichlich papillären Einstülpungen; daneben sind allerdings auch vielfach solide Stellen vorhanden. Zahlreiche Nekrosen fallen auf. Und neben den blasigen differenten polygonalen Zellen sieht man, wenn auch im Vergleich zum später beschriebenen Rezidiv und zur Metastase relativ wenige mehrkernige Zellen und homogene konsistente Gebilde.

22. September 1926 kam die Patientin zur Nachuntersuchung. Die Operationswunde erscheint gut verheilt.

Doch ergibt sich als Untersuchungsbefund im vorderen Scheidengewölbe ein kleiner Knoten; und ebenso sind im Douglas einige Knoten fühlbar.

Die Patientin erhält 14 Tage später eine Radiumeinlage (52 mg E. $\times$ 24 Stunden).

6. Oktober 1926 erscheint daraufhin das Parametrium weich; der Portiofortsatz ohne auffallenden Befund.

27. Juni 1927 erst kommt die Patientin wieder wegen Schmerzen, die sie seit drei Wochen quälen. Vor ca. drei Wochen erfolgte ein Blutabgang.

Als Befund ergibt sich neben Ascites in der linken Unterbauchgegend ein großer, derber, knolliger Tumor, der bis drei Querfinger unterhalb des Nabels reicht, in das vordere Scheidengewölbe eindringt, den Douglas erfüllt.

Es wird eine Curettage dieses Rezidivs vorgenommen, über deren Resultat später berichtet wird.

1. Juli 1927 Exkochleation des Kraters und Einlegen eines Chlorzinktamppons.

6. Juli 1927. Das Exsudat hat stark zugenommen.

Da der Krater nicht genügend gereinigt ist, wird von einer Radiumeinlage Abstand genommen.

8. Juli 1927 machen sich starke Beschwerden, Druck über der rechten Brustseite bemerkbar.

Unter der rechten Mamma ist ein breitaussitzender unbeweglicher Tumor feststellbar, der offenbar von der Muskulatur ausgeht. Die bedeckende Haut ist gut verschieblich.

14. Juli 1927 ergibt die Durchleuchtung des Thorax keinen besonderen Befund; keine Metastase wird sichtbar.

Es erfolgt zwei Tage später eine Röntgenbestrahlung.

17. Juli 1927 zeigt sich eine eigroße derbe Vorwölbung (Metastase?) auf der linken Unterbauchseite an der Stelle, an der ungefähr 10 Tage vorher wegen Ascites eine Punktion vorgenommen wurde.

30. Juli 1927 erfolgte neuerdings eine Röntgenbestrahlung.

1. August 1927 wurde eine Probeexzision aus dem Tumor der rechten Mamma-Muskulatur vorgenommen. Über das Resultat der Untersuchung soll später berichtet werden.

3. August 1927 klagt die Patientin über zunehmende Atemnot. Über der linken Lunge ergibt sich eine Dämpfung bis zur dritten Rippe mit abgeschwächtem Atem. Die Röntgendurchleuchtung zeigt ein Pleuraexsudat. Der Allgemeinzustand ist sehr schlecht, die Temperatur subfebril, der Puls 110.

9. August 1927 erfolgt unter zunehmender Atemnot, zunehmendem Ascites, unter Benommenheit der Exitus letalis.

Die Autopsie wurde leider verweigert.

Histologisch ergibt das Rezidiv ein sehr buntes Bild. An einigen Stellen zeigt sich, ähnlich dem schon beschriebenen primären Tumor, ein zystisch drüsiger Bau mit Papillen, mit ein- und zweischichtigem Zellbelag. Meist aber ist der Bau alveolär, solider. Die Geschwulst besteht aus hellen blasigen polygonalen Zellen mit kleinem, dunklem rundem Kern, feingetüpfeltem Protoplasma; zum Teil sind die Zellen auch dunkler und ihre Struktur ist dann sehr schwer zu erkennen. Ihre Größe ist sehr verschieden. Neben den einkernigen hellen blasigen Zellen finden sich auch große Zellen mit derselben Struktur, aber mit zwei, selten auch mehr Kernen. Diese Zellen sind als Riesenzellen zu bezeichnen. Ausgesprochene Synzytien sind nicht vorhanden. Daneben sind strukturlose große dunkelgefärbte Protoplasma-massen zu sehen. Diese Zellformen nebeneinander erwecken den Eindruck eines Chorionepithelioms. Dazwischen liegen nekrotische Herde, ohne gerade besondere Beziehungen zu den Riesenzellen und Protoplasma-massen zu haben. Die Feststellung von Blutungen ist im Curetament natürlich unmöglich. Besondere Beziehungen zu den Gefäßen bestehen jedoch nicht. Noch bunter wird das Bild durch die mit der Curette mitentfernten Deck-epithelien der Vagina.

Histologisch ergibt die Mamma-Metastase überwiegend soliden alveolären Bau, daneben zeigt sie aber auch Drüsenform. Die Tumorzellen sind unregelmäßig groß, hell-blasig mit dunklem Kern, feingetüpfeltem Protoplasma wie im Rezidiv. Zum Teil zeigen sich helle blasige Stellen mit mehreren Kernen. Manchmal erweckt es den Eindruck, als wenn die Zellen ineinander übergängen, oder als ob sie durch Übereinanderlagerung große Komplexe bildeten. Auch Riesenzellen mit Vakoulen sind zu sehen. In anderen Abschnitten zeigen sich große Zellmassen, die dunkel gefärbt und homogen, keine Struktur mehr erkennen lassen. Die Riesenzellen sind manchmal inmitten eines Hohlraumes gelegen, der aber nicht mit Endothel begrenzt und wahrscheinlich künstlich entstanden ist. Meist befinden sich jedoch diese Riesenzellen inmitten der anderen Krebszellen. Dazwischen fallen größere und kleinere Nekroseherde auf. Beziehungen zu den Gefäßen sind nicht vorhanden; ebenso fehlen Blutungen; Mammadrüsen-gewebe ist nicht zu sehen, wohl aber Muskulatur und Fett. Die bindegewebigen Septen der Geschwulst sind mit Leukozyten infiltriert.

Zusammenfassend sind also die Primärtumoren in beiden Ovarien ein hochstehendes Adenokarzinom (malign entartetes Kystadenoma papillare) mit ausgeprägtem drüsenähnlichem Bau. Riesenzellbildungen sind wenig vorhanden. Nekrosen sind dagegen reichlicher sichtbar.

Die Sekundärtumoren stellen ein niederer entwickeltes solides Alveolar-karzinom dar mit wenigen Drüsen-schläuchen. Auffallend sind neben hellen blasigen Tumorzellen die vielen Riesenzellen, die homogenen konsistenten Zellmassen. An anderen Stellen scheinen auch Zellen mit einander zu verschmelzen, und Vakoulen zu enthalten. Daneben sind nekrotische Herde zahlreich zu finden.

Anschließend an meinen eigenen Fall lasse ich hier andere, in der Literatur bekannt gewordene Fälle von Schmaus und von Michel folgen, die einen sehr ähnlichen Befund bieten.

Schmaus berichtet über einen Fall von Ovarialkarzinom mit Metastasen.

Eine 49 jährige Patientin, die nie geboren hat, kommt zur Operation wegen eines den unteren Teil des Abdomens anfüllenden, prallelastischen Tumors, eines Ovarialkystoms. Es ist erfüllt mit dünnflüssig bräunlichem Inhalt. Der untere an dem Uterus adhärente Teil des Tumors ist ein papillärer solider Knoten von über Hühnereigröße, von flachhöckeriger Beschaffenheit.

Der Schnitt zeigt markige Konsistenz mit schwer zu erkennendem Gerüst, und weißliche an einigen Stellen braunrote Farbe (Blutreichthum).

Mikroskopisch zeigt der in der Ovarialzyste enthaltene Tumor im wesentlichen den Typus eines Adenokarzinoms: Theils solide, meist aber schlauchartige, d. h. ein Lumen zwischen sich lassende und aus Epithelbelag bestehende Gebilde. Die mit Zylinderepithel bekleideten Spalträume, die sich auch verzweigen, die Geschwulstmassen durchziehen und teilen, schaffen ein grobpapilläres blattartiges Aussehen. Außerdem sind noch Übergänge zu den in den Peritonäalmetastasen vorhandenen Zellformen zu sehen: An der Wand der drüsenähnlichen Schläuche treten vielfach Epithelien von besonderer Größe und abweichend von der gewöhnlichen kubischen Form hervor. Die Zellen sind unregelmäßig geformt, am Ende zugespitzt, am andern kolbig angeschwollen, zum Teil mit Ausläufern versehen; auch stellen sie stern- und halbmondförmige Gebilde dar, bilden keine Synzytien.

Ein Jahr nach der Operation ergibt die Obduktion: Ausgebreitete Neubildungen in der Peritonäalhöhle vom Charakter der sogen. Endothelkrebse, zahlreiche bis erbsengroße Knoten mit Exsudation. Histologisch zeigt sich eine mit dem Chorionepitheliom weitgehende Übereinstimmung. Es fanden sich zwei Formen von Zellen, die jedoch nicht scharf zu trennen waren: Kleinere Elemente mit meist, aber nicht immer scharfen Grenzen, welche den Zellen der Langhans'schen Schicht der fötalen Zotten gleichen; daneben große Elemente, welche meist den Charakter von Riesenzellen aufweisen, aber mitunter auch ausgeprägte Synzytien bildeten und rundliche sternförmige, mit kürzeren oder längeren Ausläufern versehene Zellen. Diese Zellen sind im allgemeinen dunkel gefärbt. Ihr Zellkörper erscheint vielfach homogen, oft von hellen scharf umschriebenen Vakuolen durchsetzt. Blasser und dunkel getüpfelte Stellen gehen ineinander über. Kerne fehlen oft ganz. Es handelt sich nach Schmaus um degenerative Erscheinungen. Auffallend war Schmaus die Lage der riesenzellähnlichen Elemente am Rande der Netzbalken und größerer und kleinerer Gefäße. An allen Stellen war der Endothelbelag von dem, wenn auch noch so innig anliegenden Synzytien trennbar; mindestens ließ sich keine Stelle nachweisen, an welcher das Lumen eines Blutraumes unmittelbar von den Synzytien begrenzt gewesen wäre.

Es fehlte eine hämorrhagische Beschaffenheit des Geschwulstgewebes, wie auch eine kavernöse Struktur. Ein Einbruch in Gefäßlumina konnte nicht nachgewiesen werden.

Schmaus findet also im Ovarialtumor und noch ausgeprägter in den Netzmastasen vielfach sich ähnelnde Formen von synzytialen Elementen.

Michel beschreibt einen ähnlichen Fall.

Die Patientin mit infatilem Uterus, die nie geboren hat, kommt zur Operation wegen eines Tumors in den mittleren Partien des Leibes, der handbreit über den Nabel reicht.

Die linke Tube befindet sich in einem mannskopfgroßen Ovarialtumor, welcher solid, aber sehr weich und zerreiblich ist. Er zeigt eine grobhöckerige Oberfläche. Manche Stellen machen einen nekrotischen Eindruck und zeigen dunkle schwarze Bezirke.

Mikroskopisch ergibt sich eine mehr alveolär gebaute Geschwulst, jedoch mit vielen Hohlräumen und papillären Einstülpungen. Das Geschwulstgerüst besteht aus faserigem, stellenweise ödematösem Bindegewebe mit langen spindeligen Zellen, während die Alveolen ausgefüllt sind mit Zellen epithelialen Charakters. In kleinen Zellmassen sind die Zapfen solide; in den großen finden sich Lumina und Gänge, die bald leer, bald mit feinfädigem Fibrin ausgefüllt sind. In die Lumina ragen papilläre Einstülpungen hinein, teils als reine Epithelprossen, teils mit gefäßhaltigem Grundstock. Viele nekrotische Stellen sind vorhanden. Nur vereinzelt sind in diesen Partien noch Gefäße erhalten, die mit einem Mantel von Tumorzellen umgeben sind. Ähnlichkeit mit einem Chorionepitheliom besteht im Primärtumor nicht, aber Lumina mit papillären Einstülpungen sind charakteristisch.

2 1/2 Jahre später zeigt sich die linke Bauchhöhle wieder von einem derben, mannskopfgroßen Tumor erfüllt.

Bei der Sektion ergibt sich ein Tumor mit knolligen Aufreibungen, der teils markig, von weißgrauer Farbe, teils dunkel, schwarz, blutreich ist und leicht einbricht. Im Innern ist er erweicht, mit trüber blutiger, mit Fetzen untermischter Flüssigkeit erfüllt.

Von derselben Beschaffenheit sind auch die zahlreichen Geschwulstknoten in der Leber und in den Nieren.

Der Rezidivtumor und noch mehr die Metastasen zeigen ein wechselvolles mikroskopisches Bild. In den helleren Knoten des Haupttumors herrscht ein deutlich alveolärer Bau vor. In den Maschen eines gefäßreichen bindegewebigen Gerüsts mit zahlreichen spindeligen Zellen befinden sich polyedrische scharfbegrenzte blasige Zellen durchweg vom typischen Charakter der Karzinomzellen. Einige Alveolen sind mit nekrotischem Gewebe erfüllt. Inmitten der Zellkomplexe finden sich allerdings eigenartige Spalten und Lumina mit papillären Einstülpungen aus blasigen polyedrischen Zellen. Jedoch überwiegen die Spalten nicht so, wie im Primärtumor.

Die dunkleren schwarzroten Abschnitte bestehen aus Blutergüssen und Fibrinnetzen mit noch deutlichen Konturen blutgefüllter Gefäße, um welche gut abgegrenzte polyedrische Zellen liegen, die den Endothelbelag zum Teil ersetzt haben. Daneben zeigen sich stark tingierte Protoplasma-massen mit großen vielgestaltigen Körnern, die auch die hämorrhagischen, fibrinösen Bezirke umfassen und in diese bandartig eindringen und Lumina bilden, die von roten Blutkörperchen erfüllt sind.

Gemeinsam ist nun für unseren Fall wie für die Tumoren von Schmaus und Michel, daß der Primärtumor stets ein Karzinom darstellt mit mehr oder weniger ausgeprägter Bildung von Zysten und Spalten, in die papilläre Ausfülpungen hineinragen. In unserem Falle und bei Schmaus handelt es sich um ein ausgesprochenes Adenokarzinom, wäh-

rend der Primärtumor bei Michel ein Alveolärkarzinom mit allerdings sehr reichlichen Spalten und papillären Einstülpungen darstellt.

Die sekundären Tumoren sind dagegen in jedem Falle solider, alveolär gebaut. In dem Primärtumor ganz besonders aber in den Sekundärtumoren fielen immer Riesenzellbildungen neben den unregelmäßig großen polygonalen bläsigen Tumorzellen auf; es zeigt sich also ein chorion-epitheliomartiges Bild. Daneben sind mit Vakuolen durchsetzte Zellen sichtbar und homogene konsistente Massen: allen gemeinsam ist auch die Nekrose einzelner Teile; häufig, aber nicht immer sind Blutungen vorhanden.

Was nun die nähere Entstehung der Riesenzellbildungen in Karzinomen betrifft, die uns besonders interessiert, so sind zweierlei Entstehungen möglich, aus Stroma, d. h. Bindegewebssubstanzen und Endothelien und aus Krebsparenchym.

Bei der Entstehung aus dem Stroma üben die wachsenden Geschwulstelemente auf die Bindegewebssubstanzen einen Reiz aus, der je nach dem Orte der Entwicklung, dem Organ, dem Alter des Individuums verschieden ist. Obendrein scheint noch eine spezifisch formative Einwirkung der epithelialen Geschwulstparenchyme auf das Stroma vorhanden zu sein, die dann auch in den Metastasen fortzuwirken pflegt. Die Endothelien besonders werden epitheloid, polymorph, protoplasmareich mit bläschenförmigem Kern, wuchern, bilden neue Gefäßanlagen und Protoplasamassen, Riesenzellen. Sie werden infolge der flachen Ausbreitung ihres protoplasmareichen Körpers geradezu als prädisponiert angesehen zu mangelhafter Ab schnürung des Zell-Leibs nach erfolgter Kernteilung und zu inniger Verschweißung mit gleichartigen Gebilden. Borst glaubt, daß eine große Anzahl von Riesenzellen in Karzinomen auf diese Weise entstehen. V. Recklinghausen weist darauf hin, daß besonders Karzinome in Lymphdrüsen, Lymphbahnen zu solchen endothelialen Wucherungen mit chorion-epitheliomähnlichen Riesenzellen anregen.

Auch Fremdkörperriesenzellen mit periphergelegenen Kernen kommen in Karzinomen in Umgebung von Zerfallsherden vor, aber wohl mehr in Kankroiden um zerfallene Hornmassen.

Eine große Zahl der Riesenzellen sind wohl parenchymatösen Ursprungs (Borst, Rissel).

Wir unterscheiden eine primäre und eine sekundäre Riesenzellbildung. Die erstere entspricht der den malignen Geschwülsten eigenen Variabilität der Zell- und Kernformen und beruht auf pathologischer Kernteilung, d. h. ungleichmäßiger und fortgesetzter Kernteilung bei ausbleibender Protoplasmateilung. Diese Riesenzellbildung kann nicht als degenerativ angesprochen werden, sondern ist, wie gesagt, primär eine Eigenart des Parenchyms bösartiger Geschwülste.

Dieser primären Riesenzellbildung gegenüberzustellen ist die sekundäre. Diese stellt eine Degeneration durch Wachstumsdruck, Ernährungsstörung, pathologischen Stoffwechsel dar.

Es findet eine Kernteilung im Sinne der Karyorhexis statt. Die einzelnen Kernteile hängen oft noch miteinander durch Chromatinfäden zusammen. Dies bietet ähnliche Bilder wie die Entstehung der Riesenzellen durch fortgesetzte mitotische Kernteilung bei ausbleibender Protoplasmateilung. — Fraglich erscheint **Borst** die Bildung von Riesenzellen durch Konfluenz. —

Ein ähnliches Bild mag wohl eine eigenartige, wahrscheinlich der hydropischen Degeneration ähnliche Entartung in schnell wachsenden Karzinomen vor allem des Uterus bieten. Die protoplasmareichen Leiber der Zellen scheinen gegenseitig peripher zu verschmelzen, während die Zellkörper von massenhaften Vakuolen durchsetzt sind (schaumige Degeneration). Es entsteht ein spongoides Netzwerk, in welchem die fast nackten Kerne liegen.

Bei der Karyorhexis kommt es also zu Riesenzellbildungen. Doch ist dies nicht das Endstadium: Allmählich tritt Zerfall des Chromatins zu verschieden großen rundlichen Körnern, Auflösung des Kerns, Schwund der Chromatinbröckel ein. Das gesamte Protoplasma wird zu einer homogenen konsistenten Masse, welche mehr oder minder große Affinität zu sauren Farbstoffen besitzt. Und so sehen wir als Schluß der Karyorhexis oft nur noch homogene dunkelgefärbte Gebilde.

Es steht auf jeden Fall fest, daß die meisten parenchymatösen Riesenzellen, seien sie nun durch Karyorhexis, Konfluenz oder hydropische, schaumige Degeneration bedingt, eine Degeneration, eine regressive Metamorphose darstellen.

Die primäre Riesenzellbildung durch pathologische Zellteilung entsprechend der Zell- und Kernvariabilität ist viel seltener.

Die regressive Metamorphose wird besonders bei rasch wachsenden Geschwülsten beobachtet, da die Neubildung der Gefäße nicht gleichen Schritt halten kann. Aber nicht selten ist gerade trotz relativ reichlich vorhandener wegsamer Gefäße weitgehender Zerfall vorhanden, denn die Kurzlebigkeit der Parenchymgeschwulstzellen stellt ja deren Eigenart dar.

Eine regressive Erscheinung ist auch die Nekrose, die wiederum manchmal Blutungen in den Geschwülsten dadurch hervorruft, daß die dünnwandigen Kapillaren unter geringeren Druck zu stehen kommen. Dieses Nebeneinander der Riesenzellen bzw. Synzytien, der einkernigen Tumorzellen, der Nekrosen und der evtl. Blutungen führt die Ähnlichkeit mit dem Chorionepitheliom herbei. (Polano).

In unserem Fall wie in den Fällen von Schmaus und von Michel sind nun Riesenzellen neben Nekrosen und bei Michel auch bluterfüllte Räume vorhanden. Außerdem finden wir und Schmaus Vakuolen in den Zellen, kernlose Massen mit grobkörnigem, im Zerfall begriffenem Protoplasma, homogene Gebilde. Manchmal scheinen auch Zellen miteinander zu verschmelzen (schaumige Degeneration).

Dies sind alles Erscheinungen regressiver Metamorphose.

Es handelt sich folglich um sekundäre Riesenzellbildung des Parenchyms in Karzinomen. Primäre Riesenzellbildung, pathologische Kernteilung, Mitosen sind in unserem Falle wohl auch in geringerer Zahl zu sehen, doch bedingen Sie auf jeden Fall nicht das der Geschwulst eigene Bild.

Anhaltspunkte für eine endotheliale Abstammung der Riesenzellen sind bei unserem Falle wie bei Schmaus nicht gegeben, denn überall sind die Endothelien gut erhalten und ohne pathologische Veränderungen, und Beziehungen der Riesenzellen zum Gefäßsystem sind nicht vorhanden.

Bei Michel ist dies weniger klar. An manchen Stellen fehlt das normale Endothel, und Riesenzellen und kubische Zellen, die den Tumorzellen gleichen, treten an Stelle des Endothels. Es könnte sich hier um Endothel handeln, das durch die Karzinomzellen in dieser Weise verändert wurde. Doch ist es unsere Ansicht, daß die kubischen Zellen die

gewöhnlichen Karzinomzellen sind, die sich regressiv zum Teil zu Riesen-
zellen umgestalteten und infolge gleichzeitiger Atrophie des Endothels
an dessen Stelle die Gefäße begrenzen (Polano). Dort, wo Riesen-
zellen größere Bluträume umrahmen und in diese eindringen, dürfte es
sich wohl in obigem Sinne auch um regressive Metamorphose handeln,
besonders da eine Endothelauskleidung dieser Räume meist fehlt. Und
dort, wo in diesen Bluträumen Gefäße sichtbar sind, da dürften aus ihnen
nach Nachlassen des Außendrucks infolge Nekrose die Blutungen ent-
standen sein. In allen Fällen lassen sich diese Riesenzellen also parenchy-
matös infolge regressiver Metamorphose erklären. Auch Michel denkt
bei seinen Tumoren in keiner Weise an endotheliale Abstammung.

Wenn wir uns nun fragen, was für Epithelien wohl besonders zu
Riesenzellbildungen mit Nekrose und evtl. Blutungen in Karzinomen in-
folge regressiver Metamorphose neigen, so müssen wir uns Niofi an-
schließen: daß wohl besonders drüsig-zytische Bildungen mit papillären
Einfülpungen in Frage kommen, wenn auch gerade die Sekundärtumoren,
die diese Erscheinung besonders zeigen, diese drüsig-zytische Beschaffen-
heit in viel geringerem Maße aufweisen.

Daß die Sekundärtumoren in allen Fällen hinwiederum Riesenzell-
bildungen neben Nekrosen und evtl. Blutungen zeigen, ist dadurch er-
klärlich, daß in den Metastasen und dem Rezidiv die regressive Metamor-
phose meist stärker ausgeprägt ist, wie auch der geringer differenzierte
Bau der Sekundärtumoren gegenüber dem Primärtumor nur die stärkere
Anaplasie, Atypie, zum Ausdruck bringt. Beide, regressive Metamorphose
und Anaplasie sind wiederum der Maßstab für die Schnelligkeit des Ge-
schwulstwachstums und die Bösartigkeit der Geschwulst.

Es ist hier noch einiges über den Begriff Riesenzellen zu sagen. Diese
werden im allgemeinen als den Synzytien gleichwertig angesehen und
nur durch die geringere Größe von ihnen unterschieden. Bonnet for-
dert nun, daß Synzythien nur Gebilde sind, die aktive Funktionszustände
von Zellen darstellen, sich aus ursprünglich zelligem Gewebe bilden und
sich zu solchem wieder zurückgestalten können. Dies soll dort eintreten,
wo unter besonders regen Stoffwechselvorgängen intensive Ernährung oder
mindestens eine möglichst glatte Saffleitung zum Zwecke der Resorption
und Sekretion nötig ist, (Borst bezeichnet als Synzytien Riesenzellen,
die durch Konfluenz von Zellen entstehen). Den Synzytien gegenüber
stellt Bonnet die Symplasmen, die Degenerationen im oben beschrie-
benen Sinne sind. Die Riesenzellen bei unseren Tumoren und bei
Schmaus und bei Michel dürften wir also nicht als Synzytien be-
zeichnen, sondern als Symplasmen; doch wird dies in der Literatur von
keinem Autor unterschieden. So sind auch hier zwischen Riesenzellen,
Synzytien, Symplasmen keinerlei Abgrenzungen vorgenommen worden.

Um zu unserem Falle zurückzukehren, so nehmen wir an, daß das
rechtsseitige Ovarium-Tubenkarzinom, das durch Entartung aus einem
Kystadenoma papillare entstanden, als Primärtumor anzusehen ist, von
welchem dann die Metastasierung des linken Ovars ausging. Später
stellte sich das Rezidiv im vorderen Scheidengewölbe und im Douglas-
Rezidiv folgen bei malign entarteten papillären Kystadenomen nach
Küfner in 90% der Fälle — und die Metastase in der Pektoralis-
muskulatur der rechten Mamma ein.

Bei doppelseitigen Ovarialkarzinomen ist sehr oft der Primärtumor irgendwo anders in den Baueingeweiden, der Mamma (Schlagenhaufer, zit. nach Frankl) zu suchen. Und man wird verführt den Mammatumor als primär anzusehen, da sekundäre Mammakarzinome sehr selten beschrieben werden. (Ribbert). Doch befindet sich das Karzinom in unserem Falle ja nicht im Drüsengewebe, sondern in der Muskulatur. Ferner teilt Polano auch Metastasierung von einem Ovarium in das andere mit, was die Doppelseitigkeit hier erklärt. Auch könnte multizentrische Krebsanlage in beiden Ovarien (Pfannenstiel; zit. nach Frankl) in Frage kommen, was auf Grund der häufigen Doppelseitigkeit des Kystadenoma papillare immerhin möglich wäre. Doch läßt sich dies nicht entscheiden.

Auch der histologische Unterschied der beiden Ovarialtumoren gegenüber dem Rezidiv und dem Mammatumor läßt die ersteren als die primären erscheinen: das Karzinom in beiden Ovarien ist ein hochentwickeltes, karzinomatös entartetes Kystadenoma papillare mit einigen wenigen Riesenzellen, dagegen reichlichen Nekrosen. Das Rezidiv und das Mammakarzinom hingegen zeigen das Bild eines nieder entwickelten Karzinoma solidum mit wenigen drüsenähnlichen Gebilden. Die regressiven Erscheinungen, wie Riesenzellbildungen verschiedenster Entstehungsarten, Nekrosen sind sehr reichlich. Und da die Sekundärtumoren immer stärkere regressive Metamorphose, geringere Differenzierung zeigen, so sind die Ovarialtumoren als primär, das Rezidiv und die Metastase als sekundär aufzufassen.

Ich möchte nun auf verschiedene andere Anschauungen über die Entstehung der Riesenzellen in Geschwülsten, die diesen neben helleren (bläulichen) einkernigen Tumorzellen ein chorionepitheliomähnliches Bild verleihen, eingehen. Jeder Autor glaubte seine Theorie auf ziemlich alle Geschwülste dieser Art anwenden zu können. Es wird über alle berichtet werden. Wenn eine oder die andere von ihrem Autor nicht auf die Tumoren von Michel und von Schmaus angewandt wurde, so soll sie doch der Vollständigkeit halber nun Erwähnung finden. Ausdrücklich betont sei aber, daß wir die nun folgenden Deutungen für unsern Fall, wie für die Fälle von Michel und Schmaus ablehnen.

Besonderen Nachdruck ist auf die Deutung als Chorionepitheliom nach Schwangerschaft, als Teratom (Schlagenhaufer, Rife), als Epithelioma ektodermale (Pick), als Endotheliom (Michel, Sternberg) zu legen und dann auf die Deutung als Karzinom mit besonderen Beziehungen zum Blutgefäßsystem. (Massabau, Etienne, Fergue, Rife, Michel).

Bei der Erwähnung der verschiedenen Anschauungen der Riesenzellenentstehung wird auch näher auf Hodentumoren und einige Magentumoren eingegangen. Denn bei allen wurde wegen des Vorkommens von Riesenzellen und Synzytien ihre Zugehörigkeit zu den Teratomen bzw. zu den durch Entartung der Teratome entstandenen Chorionepitheliomen erwogen.

Zu beachten ist, daß von allen Autoren besonderer Wert auf die Beziehungen der Riesenzellgebilden, Synzytien zu Degenerationszonen und zum Blutgefäßsystem bzw. hämorrhagischen Herden gelegt wird; diese Beziehungen spielen in der Deutung der Natur der Tumoren die größte Rolle.

Ohne uns ein Urteil zu erlauben, halten wir es für möglich, daß in vielen Fällen dieses Nebeneinander von Riefenzellen, Blutungen und Degenerationen eine Erscheinung regressiver Metamorphose darstellt.

Daß in manchen Fällen das stärkere Auftreten von Riefenzellbildungen in den Sekundärtumoren besonders betont wird, ließe eben auf die stärkere regressive Metamorphose der Sekundärtumoren schließen.

Anfangs wurden alle Ovarialgeschwülste mit Synzytien bzw. Riefenzellen neben helleren blasigen Einzelzellen als Chorionepitheliome aufgefaßt, teils metastasiert von der primären Nidation des Eies im Uterus, teils nach Ovarialgravidität.

Doch da häufig eine Gravidität nicht vorausgegangen war, und solche Gebilde auch in Hodengeschwülsten gefunden wurden, so schien das Teratom nach Marchand-Bonnet-Wilms diese Bildungen erklären zu können: Teratome sind nach diesen aus verlagerten oder verspätet sich teilenden Blastomeren entstanden.

Schlagenhauser (— nach dem im übrigen Teratome der Keimdrüsen aus befruchteten Polzellen entstehen —) glaubt nun, daß Eihüllenderviate wie in der Schwangerschaft entstehen und Chorionepithel bilden sollten. Er stellt die spezifische Identität der chorionepithel- oder besser chorionepitheliomähnlichen Bildungen in Teratomen mit dem Chorionepithel der Zotten bei der normalen Eieinbettung auf. Diese Bildungen in Teratomen sollten dieselben Eigenschaften besitzen, wie das entartete Chorionepithel der nach Schwangerschaft entstandenen Chorionepitheliome. Diese Eigenschaften bestehen im wesentlichen darin, daß die Synzytien, die vielkernigen Massen die Gefäße eröffnen und in diese hineinragen.

Rifel hält die chorionepithel- oder besser chorionepitheliomähnlichen Bildungen für Abkömmlinge des nicht differenzierten Ektoderms der Teratome (auch Marchand).

Diese chorionepitheliomähnlichen Bildungen, bzw. diese Chorionepitheliome sollten also durch Entartung der Teratome entstanden sein. Doch ist Rifel der Ansicht, daß auch in Karzinomen, Sarkomen solche Bilder vorkommen können.

Es kann nun die Berechtigung der Marchand-Bonnet-Wilms'schen Theorie von der Entstehung der Teratome wohl nicht bestritten werden, auch ist es sicher, daß in Teratomen chorionepitheliomähnliche Bildungen vorkommen, evtl. im Sinne des Marchand'schen atypischen Chorionepitheliom, wobei der Unterschied zwischen den hellen Langhans-Zellen und den Synzytien sich verwischt, und die Geschwulst mehr als ein polymorphzelliges Sarkom und Karzinom imponiert mit synzytialen Zellen ohne Beimischung großer synzytialer plasmoidaler Massen. (Zit. nach Niofi).

Aber diese chorionepitheliomähnlichen Bilder sind auch zu finden, wenn sonst keine Teratombestandteile vorhanden sind, das Entoderm und Mesoderm fehlen, so bei Bostrom (Gehirn), Michel, Schmaus (Ovarialtumoren), Djewtzki (Blase), Hansemann, Pick (Leber).

Das veranlaßte Pick zu der Aufstellung seiner Theorie vom Epithelioma chorioektodermale. Das Ektoderm sollte die beiden anderen Keimblätter frühzeitig überwuchert, zugrunde gerichtet haben; evtl. sollten auch die anderen Bestandteile nur übersehen worden sein. Das Chorionepithel der Keimdrüsenteratome sollte neue Eigenschaften erworben haben. Im Gegensatz zum Marchand'schen Chorionepitheliom fehlte die vasodestruierende

Eigenschaft und damit der hämorrhagische Charakter der Geschwulst. Die Geschwulst wächst nach ihm unter dem Bilde eines typischen Krebses, oder alveolären Sarkoms: es bilden sich solide Komplexe und gangartige Räume, die mit Langhans-Zellen in papillärer Anordnung ausgekleidet sind. Stellenweise können Gruppierungen um Blutgefäße Bilder eines circumskulären Sarkoms, Angiosarkoms, Perithelioms zustande kommen lassen. Auch Polano beschreibt eine Ovarialgeschwulst, die er für ein Epithelioma chorioektodermale hält.

Pick faßt viele als Karzinome, Angiosarkome, Endo- und Peritheliome beschriebene Geschwülste der Keimdrüsen als solche einseitig chorion-epithelial entwickelte, kongenital, teratomatöse Geschwülste auf. Auffallend ist also die Beziehung der Geschwulst, besonders der plasmoidalen Bestandteile zu den Gefäßen.

Frank wiederum ist, was die Entstehung der Teratome betrifft, der Ansicht, daß die Keimblätter noch sehr lange die Fähigkeit haben, sich zu zerlegen. Aber nicht nur aus somatischen Zellen, sondern erst recht aus generativen glaubt er, daß sich Teratome entwickeln, was die Häufigkeit der Teratome in den Keimdrüsen erklären würde, und diese wieder die chorionepitheliomähnlichen Bildungen.

Ähnlicher Ansicht ist in neuerer Zeit auch Forster, der an Hand eines Falles von Hodenchorionepitheliom, ohne daß ein Teratom nachweisbar war, die Ursache des Chorionepithelioms sowohl des nach Schwangerschaft entstandenen wie des ohne Schwangerschaft entstehenden, beim Manne, wie bei der Frau in der latenten Energie der Keimzellen besonders der Samenzellen oder ihrer unreifen Formen sucht, die unter bestimmten Einflüssen zu pathologischer Wucherung neigen können.

Djewitzki und auch Niosi erwägen, ob das Ektoderm und zwar nicht nur das fötale fähig sei, zu chorionepitheliomähnlichen Bildern. Doch hält Niosi dies für sehr fraglich und kommt zu dem Schlusse, daß das Epithel in drüsig-zystischen Bildungen zu chorionepitheliomähnlichen Bildern neige.

Wie nun schon erwähnt, kann das Vorkommen von chorionepitheliomähnlichen Bildungen in Teratomen nicht bezweifelt werden, obwohl selbst deren spezifische Identität mit dem Chorionepithel der Schwangerschaft d. h. ihre Abkunft aus Eihautderivaten, fötalem Ektoderm sehr angezweifelt wird. Aber diese Synzytien oder meist Riesenzellen kommen auch in anderen Geschwülsten unbedingt vor, wie in Endotheliomen, Sarkomen, Karzinomen, sodaß unter keinen Umständen alle Gebilde mit Synzytien als Teratome in ihren verschiedenen oben angeführten Modifikationen angesehen werden dürfen.

Besonders die Bindegewebssubstanzen und Endothelien der Blut- und Lymphgefäße sollen sehr zu Synzytien und Riesenzellbildungen neigen (auch Borst).

Eigentümliche vielkernige plasmoidale Massen fanden in malignen Hodengeschwülsten und noch mehr, wie fast stets, in deren Metastasen Malassez, Monod, Carnot, Marie (zit. nach Wlaffow und nach Mönkeberg) und Dopter. Sie wiesen auf die Ähnlichkeit mit dem Ranvier'schen vasoformativen Netz hin: Die Geschwülste setzen sich, wie sie meinen, aus Bindegewebszellen embryonaler Form zusammen und wurden als „Sarcomes angioblastiques“ bezeichnet. Die Riesenzellen

wurden als unentwickelte atypische Blutgefäße aufgefaßt. Dopter meint, die vielkernigen Massen entzündend durch Konfluenz. Er konnte in seinem Fall überhaupt nur in den Metastasen plasmoidale Massen vorfinden. Ovarialtumoren sind von ihnen keine beschrieben worden.

Sternberg hielt die chorionepitheliomähnlichen Wucherungen in dem von ihm beschriebenen Tumor des Hodens für Gebilde, die vom Gefäßendothel stammen sollten. Teratomanteile konnte er nicht finden. Es war im wesentlichen eine sehr hämorrhagische Neubildung. Er sah eine Vergrößerung der Gefäßwandzellen, die zum Teil in große protoplasmareiche Zellen und Klumpen mit klumpigen Kernen und mit Vakoulen übergingen. Diese sollten Gefäßsprossen darstellen und allmählich ausgehöhlt werden. Synzytiale Massen waren im primären, langsam wachsenden Tumor relativ spärlich, in den schnell wachsenden Metastasen sehr reichlich. Hier waren dagegen weniger helle polygonale Zellen vorhanden. Die Geschwulst hält er also für ein Hämangiotheliom, Endotheliom.

Er hält auch die chorionepitheliomähnlichen Bildungen in sicheren Teratomen für nicht spezifisch, sondern für eine Proliferation des Endothels. Michel selbst glaubte ja bei seinem Fall von Ovarialtumor ein Endotheliom nicht absolut ausschließen zu können. Auch v. Recklinghausen erwähnt das Vorkommen von chorionepitheliomartigen Synzytien bzw. Riefenzellbildungen in Endotheliomen.

Mönkeberg faßt Sternberg's Fall und zwei von ihm beschriebene und alle andern, die keine Teratombestandteile enthielten, als „perivasculäres Endotheliom“ auf. Er sah kubische Tumorzellen mit bläschenförmigem Kern und hellem Protoplasma, die teils papillär in Hohlräume vordringen, teils dem Kapillarendothel mantelartig aufliegen. An anderen Stellen sind Nekrosen und Blutungen vorhanden und Protoplasamassen mit mehreren Kernen und mit Vakoulen. Daneben unveränderte und gewucherte Endothelien. Wo gleichzeitig Tumorzellen vorhanden sind, ergibt sich ein chorionepitheliomähnliches Bild. Die synzytialen Massen finden sich nur da, wo in den Tumoren regressive Metamorphose, Nekrose und Blutungen vorhanden sind. Und da diese in den Metastasen ausgesprochener zu Tage treten, so sind auch vermehrt synzytiale Massen zu sehen. Mönkeberg hält die Geschwulst für ein „peritheliales Sarkom“. Die Synzytien sind wie er meint sekundäre Zutaten, die mit der eigentlichen Geschwulstentwicklung nichts zu tun haben und einen verunglückten Versuch einer Organisation der zu Grunde gegangenen Stellen von Seiten des Gefäßapparates darstellen.

Wlaffow beschreibt Hodentumoren ohne Teratomanteil und ist gegen die angioblastische Auffassung der dort vorhandenen Riefenzellen. Er setzt sie den vorhandenen einkernigen Zellen gleich, die nach ihm Epithelien sind, und dann sind die Riefenzellen auch keine Angioblasten.

Diese plasmoidalen Massen findet er vor allem in hämorrhagischen Herden, längs von Fibrinsträngen oder Überresten von nekrotischem ursprünglichem Gewebe, rings um Blutgefäße, deren Gefäßwände verschiedene Stadien der Nekrose und Atrophie zeigen. Der nebartige Bau der Riefenzellen entsteht, wie er meint, durch Verschmelzung der Ausläufer. In den Riefenzellen fand er rote Blutkörperchen vor allem dort, wo die Gefäßwandungen vollständig zu Grunde gegangen waren.

Er faßt die Riefenzellen als hämoklastisch, vasodestruierend auf und erkennt dementsprechend eine morphologische Identität derselben mit den synzytialen Zellen der Chorionzotten an; eine genetische Identität hält er für unsicher, da er die Hodentumoren kaum für Teratome mit dreiblättriger Keimanlage hält.

Nach Albrecht sind alle Hodentumoren Sarkome-Karzinome, also Mischgeschwülste. Er hält es für gleichgültig, ob sie und die Ovarialtumoren aus Teratomen entstanden sind, oder nicht. Die epitheliale Wucherung ist, wie er glaubt, das eigentliche Agens, das primäre, welches sekundär produktiv auf die Bindegewebssubstanzen einwirkt, sodaß sie in ausgeprägten Fällen direkt zu einer sarkomatösen Komponente werden. Und ebenso verhalte es sich mit den Beziehungen der Langhans-Zellen der Chorionzotten und der Langhans-Zellen des malignen Chorion-epithelioms zu den Bindegewebssubstanzen.

Massabuau und Etienne (zit. nach Rifel) beschreiben zwei Ovarialkarzinome mit chorionepitheliomähnlichen Bildungen. Eine Zerstörung der Gefäße und ein Eindringen der Riefenzellen durch die Gefäßwände konnte von ihnen aber nicht beobachtet werden. Aber in Anlehnung an ein Hodenteratom von Chavassu sehen Massabuau, Etienne und Forgue die reinen Chorionepitheliome der Ovarien als Epitheliome an, deren Zellen in Kontakt mit den Gefäßen, mit Degenerationszonen, hämorrhagischen Herden eine besondere chorionepitheliomähnliche Umwandlung erfahren haben. Auch Proust, Bender, Schlagenhauser und Pick (zit. nach Rifel) leugnen diese Möglichkeit nicht, Michel glaubt, daß die Riefenzellen in keinem Falle auf diese Weise entstanden.

Ebenso stellt Rifel die Beziehung der Synzytienbildung in Karzinomen zum strömenden Blut fest. Er erwähnt einige eigene Fälle von Magenkarzinomen und einen von Davidsohn. Der letztere bestand aus weißlichen krebigen Geschwulstelementen und setzte sich in einem sackartigen Anhang ins Netz fort mit rötlichem „plazentaähnlichem“ Gewebe“. Beide Gewebsarten zeigten auch die Metastasen in der Leber.

Das plazentaähnliche Gewebe bestand aus Zellen mit großem bläschenförmigem Kern. Daneben zeigten sich um Bluträume große vielkernige plasmoidale und auch kernlose homogene Massen. Er sah diese Massen aus karzinomatösen Zellen hervorgehen und glaubte den Grund hiezu in den günstigeren Ernährungsbedingungen in Netz und Leber vor allem nach Eröffnung der Gefäße sehen zu dürfen. An manchen Stellen glaubte er auch, daß plasmoidale Massen auf Grund degenerativer Veränderungen entstanden seien. Einen ähnlichen Fall von Magenkarzinom beschreibt auch Montanelli.

Diese Auffassungen Massabuau's, Etienne's, Forgue's, Rifel's und auch Michel's unterscheiden sich dadurch von unserer eigenen, daß wir die in manchen Fällen deutliche Beziehung der Riefenzellen zu bluterfüllten Räumen, Degenerationszonen als gleichwertige regressive Metamorphose auffassen, während die erwähnten Autoren die Riefenzellbildung sekundär von der Berührung mit hämorrhagischen Herden, Degenerationszonen abhängig machen, oder wie Rifel die Riefenzellbildung sekundär durch reichliche Ernährung zustande gekommen glauben. Doch erwähnt gerade Rifel auch die Möglichkeit der Riefenzellentstehung auf Grund degenerativer Veränderungen.

Niofi schreibt, wie schon erwähnt, vor allem drüsig-zytischen epithelialen Bildungen mit papillären Wucherungen die Neigung zu Riesenzellbildung zu.

Was nun die erwähnten Hodentumoren betrifft, so ist es nicht unsere Aufgabe ihre Natur zu beurteilen. Sicher erscheint es, daß viele Tumoren, in denen zahlreiche Riesenzellen bezw. Synzytien neben Nekrosen und Beziehungen der Riesenzellen zum Blutgefäßsystem bezw. zu Blutungs-herden auffallen, Karzinome sind mit Erscheinungen regressiver Metamorphose entsprechend unserem Falle und den Fällen von Schmaus und von Michel. Solche Karzinome werden auch die Ovarialtumoren von Massabuau und Etienne und die Magentumoren von Rifel und von Davidsohn sein.

Im übrigen stimmen wir Niofi's Ansicht zu: es mögen gerade die Epithelien zytisch-drüsiger Bildungen oder Abkömmlinge dieser, denn in Metastasen ist dieser zytisch-drüsige Charakter oft weniger auffallend, zu regressiver Metamorphose neigen.

Diese verschiedenen Ansichten kommen also, da wir die Riesenzellen durch regressiv Metamorphose entstanden glauben, für unsern Fall wie für die Tumoren von Schmaus und von Michel mit Ausnahme der Anschauung Niofi's nicht in Frage. Ganz besonders sind irgendwelche Beziehungen zum Chorionepithelium nach Schwangerschaft, zu Teratomen (Schlagenhauser, Rifel, Pick), zum Epithelioma chorioektodermale (Pick) bestimmt nicht festzustellen. Am ehesten käme noch die Deutung der Tumoren als Endotheliome in Frage (v. Recklinghausen, Michel, Sternberg), gilt doch die Neigung der Endotheliome zu karzinom-ähnlichen Bildungen als charakteristisch. Da wir aber eine Beziehung der Endothelien zu den Riesenzellen in unserem Fall und im Falle Schmaus nicht feststellen konnten und die evtl. feststellbaren Beziehungen im Falle Michel anders erklärt haben, ist die Deutung der Tumoren als Endotheliome hinfällig.

Unsere Tumoren, wie die Tumoren von Michel und von Schmaus sind unbestritten Karzinome. Der Ansicht, die Riesenzellen würden sich in Karzinomen durch Beziehungen zum Blutgefäßsystem, zu hämorrhagischen Herden und zu Degenerationszonen bilden (Rifel, Massabuau, Etienne, Forgue, Michel) können wir jedoch nicht zustimmen, da Beziehungen der Riesenzellen zu dem Blutgefäßsystem, zu hämorrhagischen Herden in unserem Falle und bei Schmaus fehlen und sich fragliche Beziehungen bei Michel in anderer Weise deuten lassen.

Wir sind der Ansicht (wie schon Bonnet und Rifel), daß sich Synzytien bezw. Riesenzellen in Karzinomen infolge regressiver Metamorphose häufig finden. Und zwar scheinen zytisch-drüsige Karzinome mit papillären Wucherungen (Niofi) und besonders deren solidere, mehr alveolär gebaute Sekundärtumoren (Metastasen und Rezidive) zu Synzytien bezw. Riesenzellbildungen und anderen Erscheinungen regressiver Metamorphose, wie Nekrosen und hämorrhagischen Herden zu neigen. Diese Erscheinungen regressiver Metamorphose, Synzytien bezw. Riesenzellen, Nekrosen und hämorrhagische Herde mögen neben einkernigen, etwas blasigen und dadurch an Langhans-Zellen erinnernden Karzinomzellen manchmal ein chorionepitheliomähnliches Bild bieten.

LITERATUR-VERZEICHNIS.

- Albrecht: Verh. d. deutsch. path. Ges. Jg. 1908, Bd. III, Zbl. f. Gyn. Jg. 1909.
- Aschoff: Allgem. u. spez. path. Anatomie.
- Bonnet: Monatschrift f. Geb. u. Gyn. Bd. XVII.
- Borst: Lehre von den Geschwülsten. Wiesbaden 1902.
- Aschmann: Allgem. Pathologie der malignen Geschwülste. Leipzig 1924.
- Verh. d. deutsch. path. Ges. Jahrg. 1907, Bd. XI.
- Dopter: Archives de méd. expérim. Jg. 1900, Bd. XII.
- Forgue: Semaine med. Jg. 1906.
- Forster: Jahresbericht f. Geb. u. Gyn. Jg. 1922.
- Frank: Frankf. Zeitschr. f. Path. Jg. 1911/12, Bd. IX.
- Frankl: Archiv f. Gyn. Bd. CXIII.
- Marchand: Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Jg. 1898.
- Michel: Zbl. f. Gyn. Jg. 1905.
- Mönkeberg: Virchow's Archiv Jg. 1907, Bd. CXC.
- Montanelli: Zbl. f. Gyn. Jg. 1910.
- Niofi: Virchow's Archiv Jg. 1907, Bd. CXC.
- Pick: Berlin. klin. Wochenschr. Jg. 1904.
- Polano: Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Jg. 1904.
- Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Jg. 1926.
- Ribbert: Geschwulstlehre.
- v. Recklinghausen: Verh. d. deutsch. pathol. Ges. Jg. 1902. Bd. V.
- Risfel: Verh. d. deutsch. path. Ges. Jg. 1907, Bd. XI, Jg. 1908, Bd. XII, Jg. 1912. Bd. XVII.
- Lubarsch-Olftertag's Ergebn. d. allg. Path. Jg. 1907, Bd. XI, 2.
- Ziegler's Beiträge Jg. 1907, Bd. XIII.
- Halban-Seitz: Biologie und Pathologie des Weibes. Berlin-Wien 1924-28. Bd. V, 2. Teil.
- Sternberg: Verh. d. deutsch. path. Ges. Jg. 1904, Bd. VII u. VIII.
- Schlagenhauser: Wiener klin. Wochenschr. Jg. 1898 u. 1902.
- Schmaus: Hegar's Beiträge z. Gyn. Bd. X.
- Voigt: Zbl. f. Gyn. Jg. 1925.
- Wlaffow: Virchow's Archiv Jg. 1902, Bd. CLXIX.
- Zweifel-Payr: Klinik der bösartigen Geschwülste. Leipzig 1924-26.

Zum Schluß gestatte ich mir meinem hochverehrten Lehrer Herrn Professor Polano für die Überlassung des Themas und Materials meinen ergebensten Dank auszusprechen, desgleichen Herrn Dr. G. Bodechtel und Herrn Dr. S. Georgii für liebenswürdige Unterstützung.

Lebenslauf.

Als Sohn des Landrichters Alfred Rall und seiner Ehefrau Emma Rall, geb. Heiß, bin ich am 18. Juli 1904 zu Ulm a. D. geboren. Ich besuchte das Gymnasium bzw. Lateinschule zu Stuttgart, Blaubeuren und Ulm. Im Frühjahr 1923 begann ich das Studium der Medizin. Vier Semester verbrachte ich in Tübingen und bestand nach Schluß des fünften in Rostock die ärztliche Vorprüfung. Dann studierte ich in Berlin, in Hamburg und in München. Am 15. Juni 1928 legte ich in München das medizinische Staatsexamen ab.

Als Medizinalpraktikant war ich an der Universitäts-Frauenklinik zu München und der Chirurgischen Abteilung des städtischen Krankenhauses Stuttgart-Cannstatt tätig. Seit 1. Mai bin ich in derselben Eigenschaft an der inneren Abteilung des Krankenhauses Stuttgart-Cannstatt.

